NutriFert®
Damos Nutrición a su Cultivo...

FICHA TÉCNICA

ALGA RED+

BIOESTIMULANTE A BASE DE ALGA ROJA KAPPAPHYCUS ALVAREZZI Y ALGA PARDA DURVILLAEA ANTARTICA

Nombre comercial: Alga Red+
Grupo: Bioestimulante
Grado: Agrícola
Comercializado por: Nutrifert Chile Ltda.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Al ser un producto natural, ***Nutrifert Alga Red +*** es compatible con los productos fitosanitarios de uso convencional. ***Nutrifert Alga Red +*** actúa estimulando el metabolismo de la planta y equilibra sus funciones fisiológicas a nivel de las células, de manera integral desarrollando su potencial productivo frente al estrés climático. Este efecto se traduce en un adecuado desarrollo de raíz lo que se refleja en un crecimiento vegetativo, floración, fructificación y desarrollo de frutos.

Nutrifert Alga Red + se puede adicionar directamente al estanque del equipo pulverizador a medio llenar de agua y completar a volumen total con agitación.

COMPOSICIÓN MÍNIMA

Extracto de *Kappaphycus Alvarezzi* ..... 15% p/v
Extracto de *Durvillaea Antartica* ..... 10% p/v

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS

pH	: 4
Densidad g/L	: 1100 a 20°C
Solubilidad en agua	: 100% a 20°C

NutriFert®
Damos Nutrición a su Cultivo...

FICHA TÉCNICA

ALGA RED+

BIOESTIMULANTE A BASE DE ALGA ROJA KAPPAPHYCUS ALVAREZZI Y ALGA PARDA DURVILLAEA ANTARTICA

Recomendaciones de uso.

Cultivo	*Dosis Litros/ha - cc/litro agua*	*Número de aplicaciones*	*Momento de aplicación*
Cerezos, naranjos, limoneros, pomelos, mandarinos, olivos, paltos.	250 cc/100L agua	3 - 4 cada 15 días	Antes y después de floración.
Vid de mesa, vid ninífera, vid pisquera.	4 - 7 L/ Ha	3 - 4 cada 15 días	Antes y después de floración.
Arándanos, frutillas, moras, frambuesas.	3 - 4 L/ Ha	3 - 4 cada 10 días	Antes y después de floración.
Frejol, arveja, haba, maravilla, lupino, maíz.	1,5 - 2 L/ Ha 250 - 350 cc/100L agua	2 - 4 cada 15 días	Antes de la floración.
Melones, sandias, pepinos, zapallos.	1,5 - 2 L/ Ha 250 - 350 cc/100L agua	2 - 4 cada 15 días	Con botón floral.
Tomates, ají, pimientos.	1,5 - 2 L/ Ha 250 - 350 cc/100L agua	2 - 4 cada 15 días	Con plantas de 30 cm.
Hortalizas de hojas.	1,5 - 2 L/ Ha 250 - 350 cc/100L agua	2 - 4 cada 15 días	Desde dos hojas verdaderas.
Tabaco.	1,5 - 2 L/ Ha 250 - 350 cc/100L agua	2 - 3	A los 20 días de transplante.
Avellano, manzano, peral y kiwi.	1,5 - 2 L/ Ha 250 - 350 cc/100L agua	2 - 3 cada 20 días	Cada 3 meses.
Soya, canola.	1,5 - 2 L/ Ha 250 - 350 cc/100L agua	2 - 4 cada 15 días	Antes y después de floración.
Arroz, trigo.	1,5 - 2 L/ Ha 250 - 350 cc/100L agua	3	1ª en macollamiento, 2ª en embuchamiento y última en el espigamiento.
Brócoli, coliflor, ajo, cebolla, puerro, cebollín, repollo.	1,5 - 2 L/ Ha 250 - 350 cc/100L agua	3 cada 20 días	1ª a los 20 días del trasplante.
Papa, camote, alcachofa, esparrago.	1,5 - 2 L/ Ha 250 - 350 cc/100L agua	2 - 4 cada 15 días	Antes y después de floración.
Ornamentales.	1,5 - 2 L/ Ha 250 - 350 cc/100L agua	2 - 4	Inicio de botón floral, después de cada corte.

ADVERTENCIAS

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos preveer todas las condiciones correspondiantes, declinamos a toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se va de nuestro control directo.

PRESENTACIONES:

1, 5 y 20 Litros

Las Virginias 1045 Rengo, VI Región - Chile
Contacto: +56 9 71281173 +56 9 3370 0270

NS GROUP HOLDING
PART OF