

Ovo-6[®]

Medroxiprogesterona Acetato 50 mg/mL

Suspensión Inyectable

Anticonceptivo para perras y gatas

ANTICONCEPTIVO
DE DEPÓSITO EN
DOSIS ÚNICA

PREVIENE
EL ESTRO EN
PERRAS Y GATAS

USO EN PERÍODO
DE ANESTRO

ADMINISTRACIÓN
CADA 6 MESES
EN PERRAS Y
CADA 3 MESES
EN GATAS



INCLUYE

Jeringa



DRAG PHARMA[®]
CONFIABILIDAD TERAPEUTICA



www.dragpharma.cl



Laboratorio Drag Pharma



[dragpharma](https://www.instagram.com/dragpharma)

Ovo-6®

Medroxiprogesterona Acetato 50 mg/mL

Suspensión Inyectable

ANTICONCEPTIVO

Composición:

Cada 1 mL de suspensión inyectable contiene:
Medroxiprogesterona Acetato..... 50 mg
Excipientes c.s.p..... 1 mL

Especies de destino:

Perras y gatas.

Indicaciones de uso:

Anticonceptivo de depósito en dosis única. Previene el estro en perras y gatas, cuando es administrado en período de anestro.

Vía de administración:

Vía intramuscular o subcutánea en la cara interna del muslo.

Dosis del principio activo:

Perras: Administrar 2,5 a 3 mg/Kg en dosis única.

Gatas: Administrar 25 mg totales en dosis única.

Dosis del producto:

Perras:

- **Hasta 20 Kg:** Administrar 1 mL en dosis única.

- **De 20 Kg o más:** Administrar 2 mL en dosis única.

Gatas: 0,5 mL en dosis única. Para el control reproductivo a largo plazo, la administración del producto debe realizarse cada 6 meses en perras y cada 3 meses en gatas. Dosis única.

Modo de empleo:

Administrar exclusivamente en anestro.

Efectos adversos y reacciones adversas:

- Cuando se administra por vía subcutánea pueden observarse despigmentación de la piel, adelgazamiento de la piel o depilación de la zona de aplicación.
- Puede existir incremento del apetito y/o sed, depresión, letargia, cambios conductuales, depresión adrenocortical, cambios mamarios (incluyendo agrandamiento, producción láctea y neoplasias), acromegalia, diabetes mellitus y piometra.
- Los efectos adversos están relacionados con la administración de esta hormona durante otros estados del ciclo reproductivo que no corresponda al período de anestro.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

- Agitar bien la ampolla antes de extraer su contenido.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Administrar solamente en período diagnosticado de anestro.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

Los progestágenos presentan interacciones con las siguientes drogas:

- **Drogas antidiabéticas:** Antagonismo del efecto hipoglicemiante.
- **Barbitúricos, Griseofulvina y Fenitoína:** Reducen la concentración plasmática de progestágenos.
- **Teofilina:** Aumenta la concentración plasmática de Teofilina.
- **Warfarina:** Reduce el efecto anticoagulante.



Contraindicaciones:

- No administrar en período de proestro, estro y metaestro.
- No administrar en presencia de tumores mamarios de naturaleza desconocida.
- No administrar en animales con antecedentes de infecciones génito-urinarias.
- No administrar en perras con antecedentes de falsa preñez.
- No administrar en animales con descarga vaginal anormal y persistente.
- No administrar en animales con celos irregulares y hembras de primer celo.
- No administrar a hembras en período de gestación o lactancia.

Precauciones especiales para el operador:

- No manipular por personas hipersensibles a progestágenos.
- No manipular por mujeres embarazadas ni en lactancia.
- Lavarse las manos con abundante agua inmediatamente después de administrar el producto.
- En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.
- En caso de inyección accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar el inserto del producto.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con resto de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar entre 2 y 30 °C, protegido de la luz. Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.

Condición de venta:

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

Reg. SAG N° 361-B

USO VETERINARIO

Elaborado por:
Uzinas Químicas Brasileiras S.A.
Praça Dr. Joaquim Batista,
150 Jaboticabal – SP, Brasil,
para Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

DRAG PHARMA®
CONFIABILIDAD TERAPEUTICA

Importado y distribuido por:
Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
Lautaro N° 300 • Quilicura • Santiago • Chile
www.dragpharma.cl



DRAG PHARMA®
CONFIABILIDAD TERAPEUTICA