DIMODROL®

MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 50 mg/mL SUSPENSIÓN INYECTABLE

Código
400165

Composición
Cada 1 mL de producto contiene:
Medroxiprogesterona acetato 50 mg
(Equivalente a 44,5 mg de Medroxiprogesterona base)
Excipientes c.s.p. 1 mL

Especie de destino
Perras y gatas.

Indicaciones
Anticoncepción por inhibición del estro (celo).

Vía de administración y dosis
Vía intramuscular o subcutánea (en cara interna del muslo, para evitar decoloración del punto de inyección).

	DOSIS PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS PRODUCTO	RITMO HORARIO
PERRAS	44,5 mg de Medroxiprogesterona acetato para animales de hasta 15 kg P.V.	1 mL DIMODROL® para animales de hasta 15 kg P.V.	Si es necesario y con prescripción médico veterinaria se puede repetir no antes de los 6 meses.
	100 mg de Medroxiprogesterona acetato para animales de 16 o más kg P.V.	2 mL DIMODROL® para animales de 16 kg P.V. o más.	Si es necesario y con prescripción médico veterinaria se puede repetir no antes de los 6 meses
GATAS	22,25 mg de Medroxiprogesterona acetato para animales entre 3 y 5 kg P.V.	0,5 mL DIMODROL® por gata.	Si es necesario y con prescripción médico veterinaria se puede repetir no antes de los 6 meses

Advertencias y precauciones especiales de uso
Es imprescindible la prescripción por parte de un Médico Veterinario, puesto que debe ser aplicada exclusivamente en anestro. Agitar antes de usar. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos

Interacciones
No usar en forma concomitante con otros glucocorticoides o estrógenos.

Sobredosis
Poco probable si se utiliza según indicación.

Efectos no deseados y reacciones adversas
Se ha descrito la aparición de nódulos mamarios tras altas dosis de esteroides progestágenos, incluido el acetato de medroxiprogesterona a dosis ≥ 3 mg/kg p.v. Se ha descrito la aparición de patologías uterinas (hiperplasia endometrial quística, piómetra, tumores etc.) tras el tratamiento con este fármaco, que se ha relacionado con dosis elevadas, tratamiento a intervalos inferiores a 6 meses, tratamientos largos (más de tres inyecciones consecutivas) o uso fuera del periodo de anestro. Se ha descrito aumento del riesgo de diabetes mellitus y acromegalia relacionado con dosis elevadas y tratamientos a intervalos inferiores a 6 meses o tratamientos largos (más de 3 inyecciones consecutivas). Se ha observado aumento del apetito ganancia de peso y polidipsia, así como un efecto tranquilizante o una ligera depresión en perras tratadas.

Contraindicaciones
No usar en perras con antecedentes de infecciones en el tracto genital, ni a nivel mamario. No administrar en hembras antes o durante el primer celo, por retrasar el desarrollo sexual fisiológico. No administrar a animales hipersensibles a glucocorticoides tales como medroxiprogesterona.

Uso durante preñez y lactancia
No usar.

Precauciones especiales para el operador:
En caso de contacto accidental del producto con los ojos, lavar con abundante agua. Lavarse las manos con agua y jabón luego del tratamiento. No manipular por personas hipersensibles a los glucocorticoides o por embarazadas. En caso de autoinyección acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar etiqueta del producto.

Período de eficacia
36 meses.

Almacenamiento
Mantener a temperatura ambiente (entre 15-30°C), en lugar seco, protegido de la luz, en su envase original, debidamente rotulado y bien cerrado.

Presentación
Estuche conteniendo frasco de vidrio de 1 mL.

Condición de venta
Venta bajo receta médico-veterinaria.

Fabricado y distribuido por
Veterquimica S.A.

USO VETERINARIO
REG. SAG N°682-B
REG. SENASA N° F.16.42.I.0131

Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl

Camino a Lonquén 10387 - Maipú - Santiago / Francisco Bilbao 1469 – Osorno / Bernardino 1986 – Puerto Montt /
Teléfono 56-2 2384 4000 / www.veterquimica.com

VETERQUIMICA
CREANDO SALUD ANIMAL