

FACILPART®

Oxitocina 10 U.I./mL

Hormonas de Reproducción - Solución Inyectable

REG. SAG N° 134-B

COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:
Oxitocina sintética 10 U.I.
Excipientes c.s.p. 1 mL

ESPECIES DE DESTINO

Vacas, Ovejas, Cabras, Yeguas, Cerdas, Perras y Gatas.

INDICACIONES DE USO

En general y para todas las especies:

- Inducción al parto.
- Inercia o atonía uterina.
- Involution del útero tras cesáreas y disminución de hemorragias.
- Expulsión de placenta, membranas que envuelven al feto y restos de exudados tras el parto.
- Iniciación de la lactancia tras el parto.
- Agalaxia en la cerda.
- Píometra y endometritis crónicas para provocar la expulsión de residuos y facilitar el drenaje.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Obstetricia: administrar vía endovenosa, intramuscular o subcutánea.

- Vacas: 75 - 100 U.I. (equivalente a 7,5 - 10 mL de Facilpart®).
- Yeguas: 75 - 150 U.I. (equivalente a 7,5 - 15 mL de Facilpart®).
- Cerdas, cabras y ovejas: 30 - 50 U.I. (equivalente a 3 - 5 mL de Facilpart®).
- Perras: 5 - 25 U.I. (equivalente a 0,5 - 2,5 mL de Facilpart®).
- Gatas: 5 - 10 U.I. (equivalente a 0,5 - 1 mL de Facilpart®).

Eyección Láctea: administrar preferiblemente vía endovenosa.

- Vacas y Yeguas: 10 - 20 U.I. (equivalente a 1 - 2 mL de Facilpart®).
- Cerdas, cabras y ovejas: 5 - 20 U.I. (equivalente a 0,5 - 2 mL de Facilpart®).
- Perras: 2 - 10 U.I. (equivalente a 0,2 - 1 mL de Facilpart®).
- Gatas: 1 - 10 U.I. (equivalente a 0,1 - 1 mL de Facilpart®).

La administración puede repetirse cada 30 minutos, si el Médico Veterinario lo considera necesario.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en hembras en gestación hasta el momento del parto.

No administrar en casos de:

- Hipersensibilidad al medicamento.
- Distocias por presentación anormal, desproporción pélvico-fetal o cualquier tipo de obstrucción mecánica.
- Enfermedades cardiovasculares.
- Hembras con predisposición a ruptura uterina.
- Toxemias.
- Cuando no exista dilatación del cuello uterino (en la inducción al parto).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, y al abrigo de la luz.

PERIODO DE RESGUARDO

Carne: 0 días.

Leche: 0 días.

PRESENTACIÓN

Frascos de 100 mL y 250 mL.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO



HORMONAS

FT0127NAC20082019R1V1

