

EQUUS[®] Comprimido Oral

ANALGÉSICO, ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL



Analgésico. Antiinflamatorio no esterooidal, indicado en el tratamiento de alteraciones en músculos, tendones, ligamentos, articulaciones y piel en caballos.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Analgésico, Antiinflamatorio no esterooidal

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Fenilbutazona.....1 g

Excipientes c.s.p.....1 comprimido

INDICACIONES

Analgésico. Antiinflamatorio no esterooidal, indicado en el tratamiento de alteraciones en músculos, tendones, ligamentos, articulaciones y piel en caballos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración por vía oral.

Dosis del producto:

2 comprimidos por cada 500 kilos de peso, cada 12 horas el primer día de tratamiento, y luego 1 comprimido por cada 500 kilos de peso, cada 12 horas por 5 a 7 días.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se recomienda utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

CONTRAINDICACIONES

- No exceder una dosis máxima de 4 g por caballo al día.
- No administrar en animales hipersensibles a Fenilbutazona.
- No administrar a animales con insuficiencia cardíaca, renal o hepática, animales deshidratados, o en animales con anormalidades hematológicas o de la médula ósea.
- No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- No exceder de la dosis establecida, ya que el índice terapéutico de Fenilbutazona es bajo.
- Evitar lo posible su uso en potrillos o en animales mayores por riesgo de toxicidad renal.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Lavarse las manos después de manipular el producto. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Obtener ayuda médica.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFFECTOS ADVERSOS

Efectos no deseados y reacciones adversas:

Los efectos adversos gastrointestinales son los más importantes en la terapia con Fenilbutazona en caballos. Los posibles signos clínicos incluyen disminución del apetito, depresión, cólicos, pérdida de peso, edema abdominal, hipoproteinemia (disminución de proteínas sanguíneas) y diarrea. Además pueden ocurrir hemorragias y úlceras en la boca, esófago, estómago, intestino, ciego y colon dorsal derecho.

PERÍODO DE RESGUARDO

No administrar en animales destinados al consumo humano.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición del material de desecho:

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos. No eliminar los envases vacíos o con resto de producto en suelo o cursos de agua.

CONSERVACIÓN

Almacenar en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30° C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Estuche con 10 comprimidos.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N°: 1464

Perú: Reg. SENASA F.99.21.I.0114

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y Distribuido en Perú por:

Representaciones Durand SAC.

Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario