DIARREVET® Polvo Oral

ANTIDIARREICO.



Control de diarreas causadas por gérmenes sensibles a las sulfonamidas (*Salmonella spp, E.coli y Coccidias*).

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, caballos, cerdos, ovinos y caprinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Polvo oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antidiarreico.

COMPOSICIÓN

Cada 100 g contiene:
Sulfaguanidina Monohidrato.....15 g
Ftalilsulfatiazol.....5 g
Pectina Cítrica.....1 g
Bentonita.....2 g
Caolín Coloidal.....77 g

INDICACIONES

Control de diarreas causadas por gérmenes sensibles a las sulfonamidas (*Salmonella spp, E.coli y Coccidias*).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral.

Disolver la dosis recomendada en 100 a 200 mL de agua tibia.

Dosis del producto: (1 cucharada equivale a 10 g de producto).

	Bovinos y caballos adultos	Ovinos, caprinos, terneros y potrillos	Cerdos adultos	Cerdos pequeños
DOSIS INICIAL	20 gramos (Para 500 Kg peso vivo: Sulfaguanidina 3 g; Ftalilsulfatiazol 1 g; Pectina 0,2 g; Bentonita 0,4 g; Caolin 15,4 g)	10 gramos (Para 50 Kg peso vivo: Sulfaguanidina 1,5 g; Ftalilsulfatiazol 0,5 g; Pectina 0,1 g; Bentonita 0,2 g; Caolin 7,7 g)	15 gramos (Para 100 Kg peso vivo: Sulfaguanidina 2,25 g; Ftalilsulfatiazol 0,75 g; Pectina 0,15 g; Bentonita 0,3 g; Caolin 11,55 g)	5 gramos (Para 30Kg peso vivo: Sulfaguanidina 0,75 g; Ftalilsulfatiazol 0,25 g; Pectina 0,05 g; Bentonita 0,1 g; Caolin 3,85 g)
DOSIS MANTENCIÓN	10 gramos (Para 500 Kg peso vivo: Sulfaguanidina 1,5 g; Ftalilsulfatiazol 0,5 g; Pectina 0,1 g; Bentonita 0,2 g; Caolin 7,7 g) cada 8 horas por 4 días.	10 gramos (Para 50 Kg peso vivo: Sulfaguanidina 1,5 g; Ftalilsulfatiazol 0,5 g; Pectina 0,1 g; Bentonita 0,2 g; Caolin 7,7 g) cada 8 horas por 4 días.	10 gramos (Para 100 Kg peso vivo Sulfaguanidina 1,5 g; Ftalilsulfatiazol 0,5 g; Pectina 0,1 g; Bentonita 0,2 g; Caolin 7,7 g) cada 8 horas por 4 días.	2.5 gramos (Para 30 Kg peso vivo: Sulfaguanidina 0,375 g; Ftalilsulfatiazol 0,125 g; Pectina 0,025 g; Bentonita 0,05 g; Caolin 1,925 g) cada 8 horas por 4 días.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Los adsorbentes como el Caolín y la Pectina pueden inhibir la absorción intestinal de otros fármacos que sean administrados en conjunto o durante el tratamiento con DIARREVET®.

CONTRAINDICACIONES

No usar en pacientes con hipersensibilidad a las Sulfonamidas.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Utilizar con precaución en animales con insuficiencia renal o hepática.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 10 días (bovinos, cerdos, ovinos y caprinos). No administrar en caballos cuya carne se destine a consumo humano.
Leche: 4 días (bovinos). No administrar en ovinos o caprinos cuya leche sea destinada a consumo humano.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho:
Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15° y 30°C, protegido de la luz. Utilizar inmediatamente una vez preparado y descartar el producto sobrante.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Estuche con 25 sobres de 50 g cada uno.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

- Chile: Reg. SAG Nº 942
- Rep. Dominicana: Reg. Nº 5608

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario