FIPROKILL® SPRAY - Solución Spray

ANTIPARASITARIO EXTERNO.



FIPROKILL® SPRAY es efectivo en el control y tratamiento de la infestación por pulgas (*Ctenocephalides felis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) en perros y gatos desde los 2 días de edad, proporcionando un rápido efecto knock-down contra pulgas adultas.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución tópica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:
Fipronil..... 0,25 g
Excipientes c.s.p.....100 mL

INDICACIONES

FIPROKILL® SPRAY es efectivo en el control y tratamiento de la infestación por pulgas (*Ctenocephalides felis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) en perros y gatos desde los 2 días de edad, proporcionando un rápido efecto knock-down contra pulgas adultas.

EFICACIA

FIPROKILL® SPRAY en perros proporciona un período de protección de hasta por 3 meses contra pulgas y de hasta por 5 semanas contra garrapatas. En gatos, el período de protección contra pulgas se extiende por 4 semanas.

MODO DE APLICACIÓN

1. Aplique el producto en ambientes ventilados y asegúrese de ocupar guantes. Evitar el contacto con la piel. En caso de tomar contacto con las manos, lavar con abundante agua después de la manipulación del producto.
2. Aplique siempre a contra pelo como se indica en la figura a una distancia de aproximadamente 20 cm.
3. Las zonas sobre las cuales se debe aplicar el producto son el vientre y los flancos (pecho, abdomen, axilas, hombros y patas).
4. En animales de pelo largo, apartar el pelo y aplicar el producto a contra pelo, hasta la raíz.
5. Friccionar el pelo para que el producto penetre la piel.
6. Después de la aplicación no exponer a nuestras mascotas a fuentes de calor o fuego. Dejar secar naturalmente. No usar secador.
7. Para tratar la cara, verter un poco de producto en la palma de la mano enguantada y luego aplicar frotando suavemente la cara, evitando los ojos, boca y mucosas.
8. En animales de pelo largo o pelaje denso, se puede requerir la aplicación de una mayor cantidad de producto.
9. Se recomienda no bañar a la mascota dentro de las 48 horas antes y después de la aplicación de Fiprokill® Spray.
10. El producto es seguro en gatitos y perritos desde los 2 días de edad siempre que la aplicación se efectúe siguiendo las instrucciones del fabricante.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Dosis del principio activo:
7,5 – 15 mg/Kg.

Dosis del producto:

- **Fiprokill Spray de 50 mL y 100 mL:** Aplicar 6 a 12 atomizaciones por Kg de peso (mojando la raíz de los pelos), de manera que el animal quede completamente mojado.

- **Fiprokill Spray de 250 mL:** Aplicar 2 a 4 atomizaciones por Kg de peso (mojando la raíz de los pelos), de manera que el animal quede completamente mojado.

CONTRAINDICACIONES

- No aplicar en conejos.
- No aplicar en animales con hipersensibilidad conocida a Fipronil.

PRECAUCIONES

- Aplicar en ambientes ventilados.
- Utilizar guantes al aplicar el producto.
- No fumar, comer o beber durante la manipulación y aplicación del producto.
- Evitar el contacto con el animal tratado hasta que su pelaje se encuentre completamente seco.
- Evitar dormir con el animal tratado recientemente.
- En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.
- En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar la etiqueta del producto.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Administrar con precaución en animales debilitados y seniles.
- Producto inflamable. Mantener alejado de las fuentes de calor

EFECTOS ADVERSOS

- Si el animal se lamiese puede existir un breve período de hipersalivación (principalmente en gatos).
- Podrían ocurrir reacciones cutáneas transitorias en el sitio de aplicación como eritema, prurito o alopecia.
- En el caso de existir hipersensibilidad o irritación local se recomienda no repetir el tratamiento.

OBSERVACIONES

Preguntas frecuentes:

¿Que sucede si mi mascota se lame después de la aplicación? ¿Qué le puede ocurrir?

Fiprokill Spray está formulado con un principio activo seguro para los mamíferos, sin embargo, después de la aplicación evite que su mascota se lama hasta que su pelaje esté seco.

¿Puedo dejar que mis hijos acaricien a los animales después de la aplicación? ¿Cuánto tiempo debo esperar?

Es recomendable esperar a que la mascota se encuentre bien seca antes de tomar contacto nuevamente con ella. En caso contrario, lavar las manos con abundante agua.

¿Puedo bañar a mi mascota sin alterar la efectividad de Fiprokill Spray?

Se recomienda no bañar a la mascota al menos 48 horas después de la aplicación del producto.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15 y 30 °C, protegido de la luz. Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 12 semanas. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Frasco con válvula atomizadora con 50 mL, 100 mL y 250 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1872
Panamá: Reg. Nº RF-4541-19
Rep. Dominicana: Reg. Nº 8664
Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F N° 007256/16
Perú: Registro SENASA F.87.30.I.0193
Uruguay: Reg. MGAP N° 2020A00783

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA
TEL: +(591)222-3357
Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Importado y Distribuido en Perú por:

Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Importador en Uruguay: VIVAFIL S.A.

Av. 18 de Julio 1746 apto 601 - Montevideo - Uruguay.
grupotecnovet@gmail.com Director Técnico: DMTV Diego Cuadrado.

NOTA

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho: Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua, ya que el producto es tóxico para aves, abejas y peces. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

ARCHIVOS DESCARGABLES

Fiprokill y Fiprodrag

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario