RUMITEN® Suspensión Oral

ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO.



Indicado para el tratamiento de parasitosis gastrointestinales y pulmonares en ovinos y caprinos causadas por parásitos sensibles a la combinación de Fenbendazol y Praziquantel, como: *Moniezia spp.,* formas maduras e inmaduras de *Haemochus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Chabertia ovina, Oesophagostomum spp., Trichostrogylus spp., Trichuris ovis., Ostertagia ostertagi* (adultos y larvas hipobióticas), *Ostertagia circumcincta* y *Dictyocaulus filaria*. Se recomienda tratar a todos los animales del rebaño cada tres meses. Esto contribuye a reducir la presión de infección parasitaria, logrando el control epidemiológico.

Ficha Técnica

ESPECIES

Ovinos y caprinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario de amplio espectro.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de suspensión oral contienen:
Fenbendazol..... 2 g
Praziquantel.....1,5 g

Excipientes c.s.p.....100 mL

INDICACIONES

Indicado para el tratamiento de parasitosis gastrointestinales y pulmonares en ovinos y caprinos causadas por parásitos sensibles a la combinación de Fenbendazol y Praziquantel, como: *Moniezia spp.,* formas maduras e inmaduras de *Haemochus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Chabertia ovina, Oesophagostomum spp., Trichostrogylus spp., Trichuris ovis., Ostertagia ostertagi* (adultos y larvas hipobióticas), *Ostertagia circumcincta* y *Dictyocaulus filaria*. Se recomienda tratar a todos los animales del rebaño cada tres meses. Esto contribuye a reducir la presión de infección parasitaria, logrando el control epidemiológico.

EFICACIA

Periodo de eficacia: 36 meses.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración por vía oral.

Dosis práctica recomendada:
2,5 mL por cada 10 Kg de peso corporal en dosis única (equivalente a una dosis de 3,75 mg de Praziquantel y 5 mg de Fenbendazol por Kg de peso vivo).

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a algún principio activo.

ADVERTENCIAS

- Agitar antes de usar.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Solamente para uso oral en ovinos y caprinos.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 14 días.

Leche: 7 días.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho:
Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. No arrojar el envase vacío o con restos de producto, en ríos, lagos o torrentes de agua natural. No reutilizar el envase. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos.

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura entre 2 y 30°C, protegido de la luz.
Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 1 mes. Descartar el producto sin usar después de ese período.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 100 mL, 1 Litro y 3 Litros.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG Nº 1961

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario