

KAUPOL[®] BOVINO - Solución Inyectable

VITAMINAS, GLUCOSA Y MINERALES.



Indicado en deshidrataciones y en deficiencias de glucosa y de minerales, las que pueden ser ocasionadas por: hemorragias, diarreas, quemaduras, carencias post parto y/o envenenamiento.

En animales de producción Kaupol[®], administrado en forma concomitante con vitaminas B₁, B₆ y B₁₂, se indica como protector hepático, lipotrópico y hematopoyético.

Especialmente recomendado para animales debilitados, convalecientes, enfermos o sometidos a largas exigencias.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, cerdos, ovinos y caprinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Vitaminas, Glucosa y Minerales.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución inyectable contiene:

Riboflavina 5 Fosfato Sódico.....10 mg

Nicotinamida.....200 mg

D-glucosa Anhidra (Dextrosa).....10,0 g

Sodio.....11,96 mEq

Potasio.....	0,54 mEq
Magnesio.....	0,049 mEq
Calcio.....	0,163 mEq
Cloruro.....	12,92 mEq
Excipientes c.s.p.....	100 mL

INDICACIONES

Indicado en deshidrataciones y en deficiencias de glucosa y de minerales, las que pueden ser ocasionadas por: hemorragias, diarreas, quemaduras, carencias post parto y/o envenenamiento.

En animales de producción Kaupol[®], administrado en forma concomitante con vitaminas B₁, B₆ y B₁₂, se indica como protector hepático, lipotrópico y hematopoyético.

Especialmente recomendado para animales debilitados, convalecientes, enfermos o sometidos a largas exigencias.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración endovenosa lenta y subcutánea.

Dosis del producto:

- Bovinos y caballos (mayor o igual a 400 kilos): 1000 - 2000 mL vía E.V.
- Bovinos (mayor o igual a 400 kilos): 200 - 300 mL vía S.C.
- Bovinos y Caballos (200 - 300 kilos): 500 mL vía E.V.
- Bovinos (200 - 300 kilos): 50 a 80 mL vía S.C.
- Ovinos o Caprinos (25 - 60 kilos): 100 – 250 mL vía E.V.
- Ovinos o Caprinos (25 - 60 kilos): 40 mL vía S.C. Cerdos (mayor o igual a 120 kilos): 300 – 500 mL vía E.V.
- Cerdos (mayor o igual a 120 kilos): 300 - 500 mL vía E.V. (Indicado en deshidrataciones y hemorragias).

CONTRAINDICACIONES

No administrar en estados patológicos que requieran bajo aporte de Sodio.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 0 días.

Leche: 0 días.

CONSERVACIÓN

Mantener en lugar seco y protegido de la luz, a temperatura ambiente entre 15° y 30° C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Envase con 500 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

- Chile: Reg. SAG N° 1351
- Costa Rica: Reg. N° MAG CL4-19-01-4140
- Rep. Dominicana: Reg. N° 5914
- Panamá: Reg. N° RF-4133-18

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario