GASTROENTERIL® Suspensión Oral

ANTIMICROBIANO - ANTIPROTOZOARIO.



Gastroenteril® suspensión oral, está indicado para el tratamiento de diarreas asociadas a giardias, en perros y gatos. También está indicado en infecciones entéricas y sistémicas causadas por bacterias anaerobias obligadas sensibles al Metronidazol.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antimicrobiano - Antiprotozoario.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:
Metronidazol.....2,5 g
Excipientes c.s.p.....100 mL

INDICACIONES

Gastroenteril® suspensión oral, está indicado para el tratamiento de diarreas asociadas a giardias, en perros y gatos. También está indicado en infecciones entéricas y sistémicas causadas por bacterias anaerobias obligadas sensibles al Metronidazol.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral.

Giardiasis e infecciones por anaerobios:

- **Dosis del principio activo:** 25 mg de Metronidazol/Kg, cada 12 horas por 5-7 días*.
- **Dosis del producto:** 1 mL/Kg de peso, dos veces al día por 5 a 7 días*.

* En el caso de infecciones anaeróbicas sistémicas, la terapia se puede prolongar por 6 semanas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

- Metronidazol puede prolongar el tiempo de protrombina en pacientes medicados con Warfarina u otros anticoagulantes cumarínicos.
- El Fenobarbital o Fenitoína pueden incrementar el metabolismo del Metronidazol e incrementar la probabilidad de efectos colaterales relacionados con la dosis.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar a pacientes con hipersensibilidad al Metronidazol o derivados nitroimidazólicos.
- No utilizar durante la gestación, lactancia o en animales reproductores.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- Lavar las manos después de su uso.
- No manipular por personas hipersensibles al Metronidazol.
- En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.
- No manipular por mujeres embarazadas.
- En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar la etiqueta del producto.
- No comer, fumar ni beber durante su administración.

ADVERTENCIAS

Advertencias y precauciones especiales de uso:

- Gastroenteril® suspensión oral debe usarse con precaución en animales con disfunción hepática. En caso de deterioro hepático significativo, utilizar el 25-50% de la dosis usual.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

Vómitos, hepatotoxicidad, neutropenia. En tratamientos prolongados, signos neurológicos, los cuales remiten totalmente una vez descontinuado el uso del producto.

OBSERVACIONES

Agitar vigorosamente antes de usar.

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho:
Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con resto de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

- Almacenar a temperatura entre 2 y 30°C, protegido de la luz.
- Una vez abierto, utilizar el producto dentro de 3 meses. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta con receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 120 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 2036
Costa Rica: Reg. N° MAG CL4-42-18-5785
Uruguay: Reg. MGAP N° 2016A00378

Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F-N° 006142/14
Perú: Registro SENASA F.91.02.I.0005

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Uruguay:
Importador:
VIVAFIL S.A.
RIO NEGRO 1107 Montevideo - Uruguay,
TEL 29001112
grupotecnovet@gmail.com
Director Técnico: DMTV Diego Cuadrado.

Perú:
Importado y Distribuido por Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Bolivia:

ZOOFARMA
TEL: +(591)222-3357
Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario