GENTA-VQ

SOLUCIÓN INYECTABLE

Código
400216 - 400217 - 400218 - 400219 – 401652 - 401010

Composición
Cada 1 mL de producto contiene:
Gentamicina sulfato 169,49 mg
(equivalentes a 100 mg de Gentamicina base)
Excipientes c.s.p. 1 mL

Especie de destino
Bovinos, ovinos, caprinos, caballos, cerdos, perros y gatos.

Indicaciones
Tratamiento de cuadros infecciosos del tracto urinario, respiratorio y gastrointestinal, como también infecciones en piel y tejidos blandos causadas por bacterias Gram negativas sensibles a Gentamicina.
En bovinos, ovinos y caprinos para infecciones bacterianas del tracto respiratorio, digestivo, urinario, y casos de artritis séptica.
En caballos para infecciones del tracto respiratorio y genitourinario, como también para septicemias.
En cerdos para Colibacilosis neonatal por *E. coli*.
En perros y gatos para infecciones del tracto respiratorio, digestivo y urinario, septicemia y cuadros infecciosos en piel y tejidos blandos.

Vía de administración y dosis
Por vía intramuscular exclusiva.

	DOSIS	DOSIS PRÁCTICA	RITMO HORARIO
BOVINOS	2-3 mg/kg P.V.	0,2-0,3 mL/10 kg P.V.	Cada 8 hrs.
TERNEROS	5 mg/kg P.V	0,5 mL/10 kg P.V.	Cada 12 hrs.
CERDOS, OVINOS Y CAPRINOS	2-5 mg/kg P.V	0,2-0,5 mL/10 kg P.V.	Cada 12 hrs.
CABALLOS	3-5 mg/kg P.V	0,3-0,5 mL/10 kg P.V.	Cada 8 hrs.
POTROS	3 mg/kg P.V	0,3 mL/10 kg P.V.	Cada 12 hrs.
PERROS	4 mg/kg P.V	0,4 mL/10 kg P.V.	Cada 12 hrs.
GATOS	2-5 mg/kg P.V	0,1-0,25 mL/5 kg P.V.	Cada 12 hrs.

Advertencias y precauciones especiales de uso
No sobrepasar los 10 mL por punto de inyección.
Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Efectos no deseados y reacciones adversas
En perro y gato se mencionan cuadros de ototoxicidad, bloqueo neuromuscular y nefrosis, cuando se usan dosis altas y prolongadas de aminoglucósidos.

Contraindicaciones
No administrar a hembras preñadas, animales deshidratados, animales con insuficiencia renal y en casos de hipersensibilidad a aminoglucósidos.

Interacción con otros medicamentos
Sinergismo con antibióticos betalactámicos.
Sinergismo con antibacterianos sulfonamida-trimetoprima en el tratamiento de *E. coli* y *K. pneumoniae*.
Podría ocurrir antagonismo con Cloranfenicol, Tetraciclina y Eritromicina.

Período de resguardo
Carne: 40 días.
Leche: No usar en animales cuya leche se destine a consumo humano.

Período de eficacia
36 meses. Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar producto sobrante.

Almacenamiento
Mantener a temperatura ambiente (entre 15-30°C), en lugar seco, protegido de la luz, en su envase original, debidamente rotulado y bien cerrado.

Presentaciones
Estuche conteniendo frasco de vidrio de 10, 50 o 100 mL.
Caja conteniendo 6 frascos de vidrio de 100 mL.

Condición de venta
Venta bajo receta médico-veterinaria.

Fabricado y distribuido por
Veterquimica S.A.

Importado y distribuido por
Veterquimica Boliviana S.R.L.
Veterquimica Perú S.A.C

USO VETERINARIO
CHILE REG. SAG Nº593-B
BOLIVIA REG. SENASAG PUV-F N°000249/2003
PERÚ REG. SENASA N° F 03.01.I.302

Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl

Chile: Camino a Lonquén 10387 - Maipú - Santiago / Francisco Bilbao 1469 – Osorno / Bernardino 1986 – Puerto Montt / Teléfono 56-2 2384 4000
Bolivia: Av. Piraí 493 – Santa Cruz / Teléfono 591-52 0261
www.veterquimica.com

VETERQUIMICA
CREANDO SALUD ANIMAL