INVETROID® Solución Emulsificable

ANTIPARASITARIO EXTERNO DE EFECTO RESIDUAL.



Invetroid es un antiparasitario eficaz en el control de piojos (*Bovicola ovis, Bovicola bovis, Linognathus pedalis, Linognathus ovillus, Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Haematopinus suis*), ácaros de la sarna (*Psoroptes ovis, Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis, Sarcoptes scabiei var. suis*) y melófagos (*Melophagus ovinus*) en bovinos, ovinos y cerdos.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, ovinos y cerdos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución emulsificable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo de efecto residual.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución concentrada contiene:

Cipermetrina..... 20 g

Excipientes c.s.p.....100 mL

INDICACIONES

Invetroid es un antiparasitario eficaz en el control de piojos (*Bovicola ovis, Bovicola bovis, Linognathus pedalis, Linognathus ovillus, Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Haematopinus suis*), ácaros de la sarna (*Psoroptes ovis, Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis, Sarcoptes scabiei var. suis*) y melófagos (*Melophagus ovinus*) en bovinos, ovinos y cerdos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Bovinos y Ovinos:

- Baños para la sarna y piojos: Diluir 1 litro de Invetroid® en 1.000 litros de agua (equivalente a una concentración final de baño de 0,02%). En la reposición y refuerzo utilizar una dilución de 1,5 litros del producto en 1.000 litros de agua (equivalente a una concentración de 0,03%); ello cuando el nivel del bañadero haya descendido alrededor de un 10%.

- Para reposición y refuerzo en seco: Diluir 500 mL de Invetroid® en 1.000 litros de agua (equivalente a una concentración final de 0,01%). Esta dilución se puede usar en aspersión aplicando a razón de 3-4 litros por animal.

Melófagos del Ovino (Melophagus ovinus: “falsa garrapata”):

- Baño de inmersión: Carga: 1 litro de Invetroid® en 10.000 litros de agua (equivalente a una concentración final de baño de 0,002%). Reposición: 1 litro en 8.000 litros de agua (equivalente a una concentración de 0,025%), cuando el nivel haya bajado un 20%. Se debe asegurar que los animales queden bien mojados, sumergiéndolos totalmente al menos dos veces. Cada 10.000 animales se debe renovar el baño. Una vez terminada la faena, se debe eliminar la totalidad del líquido restante.

- Aspersión: 1 litro de Invetroid® en 5.000 litros de agua (equivalente a una concentración final de 0,004%). Este sistema se recomienda como una forma de bajar la carga de melófagos en animales recién esquilados.

Cerdos:

- Sarna y piojos: Aspersión: Diluir 1 mL de Invetroid® en 5 litros de agua (equivalente a una concentración final de 0,004%). Aplicar a razón de 3-4 litros por animal. Aplicar utilizando bomba de aspersión, distribuyendo el producto el producto de manera uniforme sobre el animal.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

- En animales con hipersensibilidad a la Cipermetrina, podría observarse irritación dérmica.

- No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

CONTRAINDICACIONES

- No bañar en horas de calor intenso, ni cuando los animales estén muy cansados y sedientos.
- No bañar a hembras en estado avanzado de preñez.
- No administrar a animales con hipersensibilidad a la Cipermetrina.

PRECAUCIONES

- Se debe asegurar que tanto los baños de inmersión como las bombas de aspersión estén completamente libres de residuos de otros productos que pudieran haberse aplicado con anterioridad.
- En caso de amenaza de lluvia, suspender el baño.
- En caso de lluvia dentro de las 24 horas posteriores al baño, repetir el tratamiento.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho: No desechar el envase vacío y/o restos de producto en el suelo, ríos, lagos o torrentes de agua. Todo medicamento no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de forma segura para el medio ambiente.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- El aplicador debe usar mascarilla y guantes como elemento de protección para la manipulación del producto.
- Evitar el contacto con los ojos, piel y mucosas, la Cipermetrina es irritante y puede producir sensibilización cutánea.
- Se debe evitar el contacto con los animales tratados hasta que estén completamente secos.
- Lavar la ropa contaminada antes de su reutilización.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. En caso de contacto ocular, lavar inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos.

ADVERTENCIAS

- Se debe asegurar que tanto los baños de inmersión como las bombas de aspersión estén completamente libres de residuos de otros productos que pudieran haberse aplicado con anterioridad.

- Utilizar la mezcla en un ambiente bien ventilado, evitando el contacto con los ojos del animal.
- En caso de amenaza de lluvia, suspender el baño. En caso de lluvia dentro de las 24 horas posteriores al baño, repetir el tratamiento.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne:

- Bovinos: 14 días.
- Ovinos y cerdos: 7 días.

Leche: 7 días.

OBSERVACIONES

- Uso externo.
- No eliminar desechos del producto en fuentes de agua, ya que es tóxico para animales acuáticos.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15 y 30°, protegido de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Envase con 100 mL y 1 Litro.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 955

Rep. Dominicana: Nº 9685

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario