AMOXICILINA 15%

Antibióticos – Suspensión Inyectable de larga acción



Reg. SAG N° 0025-B

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:

Amoxicilina trihidrato	17,25 g
(equivalente a 15 g de amoxicilina anhidra)	
Excipientes c.s.p.	100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos, Cerdos, Ovinos, Gatos y Perros.

INDICACIONES

Bovinos:

-Infecciones respiratorias causadas por *Pasteurella multocida* y *Mannheimia haemolytica*.
-Diarreas causadas por *Clostridium perfringens*.
-Metritis causadas por *Actinomyces pyogenes*.

Cerdos:

-Meningitis y artritis causadas por cepas sensibles de *Streptococcus suis*.
-Infecciones respiratorias causadas por *Pasteurella multocida*.
-Infecciones causadas por *Erysipelothrix rhusiopathiae* (mal rojo).
-Diarreas causadas por *Clostridium perfringens* y procesos infecciosos causados por *Clostridium* spp.
-Infecciones genitourinarias causadas por *Escherichia coli* y *Staphylococcus* spp.
-Infecciones intestinales causadas por *Escherichia coli*, *Salmonella* spp y *Campylobacter coli*.

Ovinos:

-Neumonías causadas por *Pasteurella multocida*.
-Diarreas causadas por *Clostridium perfringens*.

Gatos:

-Infecciones primarias y secundarias de las vías respiratorias, como rinitis causadas por *Pasteurella* spp. y *Streptococcus* spp. y bronconeumonías causadas por *Pasteurella* spp., *Escherichia coli* y *Bordetella bronchiseptica*.
-Infecciones primarias del tracto urogenital, como pielonefritis e infecciones del tracto urinario inferior causadas por *Escherichia coli,* Proteus spp., endometritis causadas por *Escherichia coli*, *Streptococcus* spp. y Proteus spp. y vaginitis resultantes de infecciones mixtas.
-Gastroenteritis causadas por *Clostridium perfringens*.
-Mastitis causadas por cocos Gram-positivos y *Escherichia coli*.
-Infecciones cutáneas locales causadas por *Streptococcus* spp.

Perros:

-Infecciones primarias y secundarias de las vías respiratorias, como rinitis causadas por *Pasteurella* spp. y *Streptococcus* spp. y bronconeumonías causadas por *Pasteurella* spp., *Escherichia coli* y *Bordetella bronchiseptica*.
-Infecciones primarias del tracto urogenital, como pielonefritis e infecciones del tracto urinario inferior causadas por *Escherichia coli* y Proteus spp., endometritis causadas por *Escherichia coli*, *Streptococcus* spp. y Proteus spp. y vaginitis resultantes de infecciones mixtas.
-Gastroenteritis causadas por *Clostridium perfringens*.
-Mastitis causadas por *Escherichia coli*.
-Infecciones cutáneas locales causadas por *Streptococcus* spp. y *Staphylococcus intermedius*.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

En todas las especies: 15 mg de amoxicilina/kg p.v. (equivalente a 1 mL de medicamento por cada 10 kg p.v.) en dosis única. En caso necesario, repetir la administración a las 48 horas.

Volumen máximo por punto de inyección
Bovino: 20 mL.
Cerdo: 5 mL.
Ovino: 5 mL.

Elaborado por
Laboratorios Syva, S.A
Avda. Párroco Pablo Díez,49-57
24010 León. España

Importado y distribuido por
Farquímica, SPA.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos – Santiago.

AMOXICILINA 15%

Antibióticos – Suspensión Inyectable de larga acción

Vía de administración: Intramuscular o subcutánea.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: Bovinos: 55 días, Ovinos y Cerdos: 30 días
Leche: 4 días (96 horas).
No administrar en ovejas en lactancia cuya leche sea destinada a consumo humano.

ADVERTENCIAS, CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños
No administrar a conejos, cobayos o hámster.
No administrar en animales con historial de alergia a los antibióticos beta-lactámicos.
Ajustar la dosis en animales con alteraciones renales
Agítese antes de usar
Utilizar jeringas secas y estériles
Dar un ligero masaje en el punto de aplicación
No administrar por vía intravenosa.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y al abrigo de la luz. No congelar.

PRESENTACIÓN

Frascos de 100 mL y 250 mL.

USO VETERINARIO

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

FT0064NAC25062020R1V3

Elaborado por
Laboratorios Syva, S.A
Avda. Párroco Pablo Díez,49-57
24010 León. España

Importado y distribuido por
Farquímica, SPA.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos – Santiago.