Colisedan®

Parasimpaticomimético

Se utiliza en el tratamiento de sobrecarga ruminal, atonías gastrointestinales, retención urinaria y cuadros de meteorismo.



Ficha Técnica

Forma Farmacéutica

Solución inyectable.

Acción terapéutica

Parasimpaticomimético.

Especies de destino

Bovinos, caballos, ovinos y cerdos.

Composición

Cada 10 mL de solución inyectable contiene:
Neostigmina Metilsulfato.....5 mg
(Equivalentes a 3,34 mg de Neostigmina base)
Excipientes c.s.p.....10 mL

Indicaciones de uso

En el tratamiento de sobrecarga ruminal, atonías gastrointestinales, retención urinaria y cuadros de meteorismo.

Vías de administración

Inyección subcutánea o intramuscular.

Dosis

Dosis de los principios activos:

- Bovinos, caballos: 1 mg / 45 Kg de peso.
- Ovinos: 1 – 1,5 mg / 45 Kg de peso.
- Porcinos: 2 – 3 mg / 45 Kg de peso.

Dosis del producto:

- Bovinos, caballos adultos: 10 a 20 mL / animal / día, SC o IM.
- Terneros, potrillos: 10 mL / animal / día, SC o IM.
- Ovinos: 0,5 mL / 10 kilos de peso / día, SC.
- Cerdos: 1 mL / 10 kilos de peso / día, IM.

Contraindicaciones

- No administrar en animales que presenten obstrucción intestinal mecánica o del tracto urinario.
- No administrar durante la gestación y lactancia.
- No administrar en animales que hayan sido tratados con otros agentes anticolinesterasa.
- No administrar en animales con hipersensibilidad a la droga.

Efectos adversos y reacciones adversas

En dosis terapéuticas se pueden presentar algunos efectos no deseados tales como: constricción de la pupila, constricción de la musculatura esquelética y un aumento en secreciones salivales, sudoríparas u otras glándulas exocrinas.

Advertencias y precauciones especiales de uso

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Administrar con precaución en animales que presenten falla cardíaca o enfermedades del tracto respiratorio.

Interacciones

- Los corticoides pueden reducir la actividad anticolinesterasa de la Neostigmina.
- La Neostigmina puede prolongar el bloqueo de la fase I de los miorrelajantes depolarizantes y antagoniza las acciones de los agentes bloqueantes neuromusculares no depolarizantes.
- La Atropina antagoniza los efectos muscarínicos de la Neostigmina y se utiliza para reducir los efectos colaterales de ésta.

Período de resguardo

Carne: 0 días.
No administrar en animales cuya leche se destine a consumo humano.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente a menos de 25 °C. No refrigerar ni congelar. Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 28 días. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo

---

Precauciones especiales para el operador

No manipular por personas hipersensibles a Neostigmina. En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua. En caso de inyección accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar etiqueta del producto.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

Condición de venta

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

Observaciones

USO VETERINARIO

Registros

Reg. SAG N° 929

Presentación

Frasco ampolla con 10 mL

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.